



מקדם הדבקה לפי מאותרים (שחור; תחום אי ודאות באפור, שחור דק- מיצו קצר)
 מקדם הדבקה לפי חולים במצב בינוני+קשה (כחול)



צפי לעליה בתחלואה קשה/בינוני
 אולם קשה בשלב זה להעריך את קצב העליה

מתפשט בישראל גל הדבקה ממשי. בלימה של הגל תחייב נקיטת צעדים משמעותיים. נראית התחלה של עליה גם בתחלואה קשה, אך אין מספיק מידע להערכת הסיכון בהיקף התחלואה הקשה בגל זה.

תצפית

מספר הנדבקים ממשיך לעלות. ניכרת התפשטות של ההדבקה והתייצבות על זמני הכפלה של כשבוע (טרם נצפית השפעה של החזרת חובת חבישת מסכות בחללים סגורים). ניכר כי יעילות החיסון במניעת הדבקה בזן דלתא מופחתת, והיא כ-60%-80%. עליה קטנה אך ממשיכה בתחלואה קשה ובינונית (חולים בודדים כל יום). סימנים חיוביים: דיווחים מבריטניה ומסינגפור המצביעים על עליה מופחתת בתחלואה קשה ולפיכך הגנה יעילה של החיסון מפני תחלואה קשה גם במקרה של הדבקה.

משמעות

לאור העיכוב המוכר בהגעה לתחלואה קשה (כ-10 ימים), אין בשלב זה מידע מספק שיאפשר להעריך כיצד גל ההדבקה הנוכחי יתבטא בתחלואה קשה.

ללא נקיטת פעולות ממשיות לא ניתן לעצור את גל ההדבקה הנוכחי. עיכוב בנקיטת צעדים עכשיו יחייב נקיטת צעדים קשים יותר להשגת השפעה דומה בהמשך.

מסקנות

מומלץ לנקוט צעדים מידיים להגבלת הדבקה: הגברת הסברה ואכיפה של מסכות בחללים סגורים, החזרת התו הירוק. מיקוד מאמצים במיגון פגיעים עד להצטברות מידע לגבי תחלואה קשה. מיגון בבתי חולים והערכות בתי חולים לגל תחלואה נוסף, שהיקפו יתברר בשבוע/שבועיים הקרובים. רק חיסון מקיף יביא לפתרון מלא - יש להגביר קצב החיסון.

