



ירידה נמשכת, השפעת פתיחת המשק ניכרת בהתייחסות מקדם ההדבקה

מקדם ההדבקה


(הערכה לפי מאומתים - שחור, לפי בינוני+קשה - כחול)



מקדם ההדבקה לפי גילאים (התחום האפור - כלל האוכלוסיה)



הערכה לפי מספר המקרים המאומתים



הערכה לפי מספר האשפוזים
במצב בינוני וקשה

השבוע נעצרה הירידה במקדם ההדבקה - כשבועיים לאחר השלב הראשון בפתיחת המשק. הפתיחה האחרונה צפויה להוביל לשינוי נוסף.


בעת הקרובה, תרומה גדלה לתחלואה קשה צפויה מבני 40-49.

בבני גיל זה עלייה כמעט רצופה במספר האשפוזים.


בגילאים האלו ובגילאים צעירים יותר (20-40): חשיבות גבוהה להתחסנות הורים (ועובדי הוראה), למניעת הדבקה נרחבת של ילדים.

התחסנות האוכלוסיה מובילה לירידה נמשכת בעומס בבתי"ח

חולים קשה באשפוז



תמותה יומית




נמשכת ירידה במספר המאושפדים, הנובעת מהתחסנות האוכלוסיה הפגיעה ביותר לאשפוזים (+50). בעת הקרובה צפויה מגמה זו להמשיך, תוך שיפור שרידות החולים – בעיקר עקב שינוי תמהיל הגילאים הנובע מההתחסנות.



ההתחסנות הרחבה מאפשרת פתיחה זהירה של המשק


תחלואה בינונית וקשה יומית -

מתחת לגיל 60




תחלואה בינונית וקשה יומית -


מעל לגיל 60



תחלואה בינונית וקשה יומית



נדבקים מאוחרים



(יש לשים לב כי גרף זה מוטה עקב מדיניות הבדיקות לפיה מחוסנים אינם נדרשים בבדיקה במגע עם חולה מאומת)

פתיחה מלאה של המשק צפויה להוביל לעלייה בתחלואה קשה במהלך מרץ.

נדרש לבצע פתיחה מבוקרת שתאפשר ניטור ומניעת התפתחות גל תחלואה נוסף.

מומלץ לבחון שינוי מדיניות בדיקות בחשיפה של מתחסנים, בכדי לבדוק ישירות את יכולת ההדבקה שלהם.

